



Minister  
Zdrowia

---

PLD.4731.5.2023.AK  
Warszawa, 10 listopada 2023

**KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA**  
**w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury**  
**ratunkowego dostępu do technologii lekowych**

Na podstawie art. 47f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1758), Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niniejszy Komunikat wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty jego publikacji..

z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Maciej Miłkowski  
Podsekretarz Stanu  
/dokument podpisany elektronicznie/



Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany	Kod ICD-10	Uwagi
1.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B	D66, D67	w populacji pacjentów <12 roku życia
2.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu	C50	brak
3.	Aimovig	<i>Erenumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Migrena przewlekła	G43	brak
4.	Ajovy	<i>Fremanezumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Migrena epizodyczna	G43	rekomendacja dotyczyła objęcia refundacją w migrenie przewlekłej i epizodycznej; <b>lek objęty refundacją w migrenie przewlekłej</b>
5.	Beriner 2000	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (HAE)	D84.1	leczenie zapobiegawcze pacjentów z nawracającymi napadami HAE o ciężkim przebiegu <b>z wyłączeniem kobiet w ciąży, u których stwierdza się niedobór inhibitora C1-esterazy</b>
6.	Beriner 3000	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy	D84.1	leczenie zapobiegawcze pacjentów z nawracającymi napadami HAE o ciężkim przebiegu <b>z wyłączeniem kobiet w ciąży, u których stwierdza się niedobór inhibitora C1-esterazy</b>
7.	Brineura	<i>Cerliponase alfa</i>	roztwór do infuzji + roztwór do przepłukiwania	Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2	E75.4	brak
8.	Brukinsa	<i>Zanubrutinib</i>	kapsułki twarde	Przewlekła białaczka limfocytowa	C91.1	monoterapia w I i kolejnych liniach leczenia u pacjentów dorosłych, bez względu na status mutacji del17p / mutTP53
9.	Beovu	<i>Brolucizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki	H35.3, H36.0	
10.	Bylvay	<i>Odevixabatum</i>	kapsułki twarde	Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa (PFIC)	K76.8	u pacjentów w wieku od 6 miesięcy

11.	Cablivi	<i>Caplacizumab</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej	M31.1	
12.	Cabometyx	<i>Cabozantinib</i>	tabletki powlekane	Nowotwór złośliwy tarczycy	C73	II linia leczenia zróżnicowanego raka tarczycy, progresja po terapii opartej na inhibitorach kinaz tyrozynowych oraz w przypadku oporności na terapię radiojodem
13.	Cresemba	<i>Isavukonazolom</i>	kapsułki twarde	Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza	B44, B46	inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
14.	Cresemba	<i>Isavukonazolom</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza	B44, B46	inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
15.	Darzalex	<i>Daratumumab</i>	roztwór o wstrzykiwań	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	terapia skojarzona z lenalidomidem i deksametazonem dorosłych chorych na uprzednio nieleczonego szpiczaka plazmocytozowego, niekwalifikujących się do autologicznego przeszczepu komórek macierzystych (autoHSCT)
16.	Elmiron	<i>Pentosan polysulfate sodium</i>	kapsułki twarde	Leczenie zespołu bolesnego pęcherza moczowego z glomerulacjami lub zmianami Hunnera, śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego	N30.1	brak
17.	Emgality	<i>Galcanezumab</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Migrena przewlekła	G43	W ramach leczenia profilaktycznego
18.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów	M05, M06, M08	brak
19.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów	M05, M06, M08	brak

20.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów	L40.5, M07.1, M07.2, M07.3	brak
21.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów	L40.5, M07.1, M07.2, M07.3	brak
22.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie aktywnej postaci zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)	M45	brak
23.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie aktywnej postaci zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)	M45	brak
24.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK	M46.8	brak
25.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK	M46.8	brak
26.	Erlotinib Krka	<i>Erlotinibi hydrochloridum</i>	tabletki powlekane	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	
27.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinib</i>	tabletki powlekane	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
28.	Erlotinib Vipharm	<i>Erlotinib</i>	tabletki powlekane	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
29.	Fotivda	<i>Tivozanib hydrochloride monohydrate</i>	kapsułki twarde	Leczenie raka nerki	C64	brak
30.	Humira	<i>Adalimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim	L73.2	brak
31.	Imbruvica	<i>Ibrutinib</i>	kapsułki twarde	Przewlekła białaczka limfocytowa	C91.1	leczenie skojarzone z wenetoklaksem w I linii leczenia pacjentów dorosłych, bez względu na status mutacji del17p/mutTP53
32.	Imbruvica	<i>Ibrutinib</i>	tabletki powlekane	Przewlekła białaczka limfocytowa	C91.1	

33.	Imfinzi	<i>Durvalumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak dróg żółciowych	C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9	I linia leczenia skojarzonego z gemcytabiną i cisplatyną dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakorakiem dróg żółciowych
34.	Kafrio	<i>Ivacaftorum + tezacaftorum + elexacaftorum</i>	tabletki powlekane	Mukowiscydoza	E84	pacjenci w wieku co najmniej 6 lat homozygotyczni pod względem mutacji F508del genu CFTR lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del z mutacją o minimalnej wartości funkcji (MF) genu CFTR
35.	Kalydeco	<i>Ivacaftorum</i>	tabletki powlekane	Mukowiscydoza	E84	pacjenci w wieku co najmniej 6 lat homozygotyczni pod względem mutacji F508del genu CFTR lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del z mutacją o minimalnej wartości funkcji (MF) genu CFTR
36.	Kanuma	<i>Sebelipazum alfa</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy	E75.5, E75.6	brak
37.	Ketokonazol HRA	<i>Ketoconazolum</i>	tabletki	Endogenny zespół Cushinga		> 12 rż
38.	Keytruda	<i>Pembrolizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Leczenie raka urotelialnego	C65, C66, C67, C68	brak
39.	Keytruda	<i>Pembrolizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Leczenie raka nerki	C64	I linia terapii, terapia skojarzona z aksytynibem
40.	Kimtrak	<i>Tebentafusp</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (koncentrat jałowy)	Czerniak błony naczyniowej oka	C69, C69.3, C69.4	monoterapia w leczeniu choroby w stadium nieresekcyjnym lub przerzutowym u dorosłych pacjentów, u których występuje ludzki antygen leukocytny HLA-A*02:01
41.	Koselugo	<i>Selumetinib</i>	kapsułki twarde	Leczenie chorych z nerwiakowłókniakami spłotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1)	Q85.0	monoterapia objawowych, nieoperacyjnych nerwiakowłókniaków spłotowatych u dzieci i młodzieży w wieku 3 lat i starszych z NF1

42.	Kymriah	<i>Tisagenlecleucel</i>	dyspersja do infuzji, 1,2 x10 <sup>6</sup> - 6x 10 <sup>8</sup> komórek w worku infuzyjnym	Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe	C82, C83, C85	leczenie dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego o stopniu złośliwości G1, G2 lub G3A, z udokumentowanym niepowodzeniem dwóch lub więcej linii leczenia systemowego, w tym zawierającego przeciwciało anti-CD20 i związki alkilujące
43.	Kyprolis	<i>Carfilzomibum</i>	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	terapia skojarzona z daratumumabem i deksametazonem dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego po uprzednim zastosowaniu 1, 2 albo 3 linii leczenia
44.	Lamzedo	<i>Velmanase alfa</i>	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy	E77.1	brak
45.	Lenvima	<i>Lenvatinib</i>	kapsułki twarde	Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym	C73	brak
46.	Lojuxta	<i>Lomitapidum</i>	kapsułki twarde	Hipercholesterolemia rodzinna	E78.01	postać homozygotyczna; populacja pacjentów dorosłych
47.	Lonquex	<i>Lipegfilgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Skrócenie czasu trwania neutropenii z gorączką lub zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką		u pacjentów z nowotworami złośliwymi (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych poddawanych chemioterapii cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14 dni
48.	Luxturna	<i>Voretigene neparvovec</i>	koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Dziedziczna dystrofia siatkówki	H35.5	u pacjentów z potwierdzoną bialleliczną mutacją genu RPE65
49.	Lynparza	<i>Olaparib</i>	tabletki powlekane	Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakiem trzustki	C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.7, C25.8, C25.9	u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2

50.	Lynparza	<i>Olaparib</i>	tabletki powlekane	Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej	C56, C57, C48	leczenie podtrzymujące dorosłych pacjentów z platynowrażliwym nawrotowym rakiem jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ang. high grade), rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej bez patogennej lub prawdopodobnie patogennej mutacji w genie BRCA1 lub BRCA2 (dziedzicznej lub somatycznej), u których uzyskano odpowiedź (całkowitą lub częściową) na chemioterapię opartą na związkach platyny
51.	MabThera	<i>Rituximab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Chłoniaki złośliwe	C82, C83	brak
52.	Mekinist	<i>Trametinib</i>	tabletki powlekane	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
53.	Metopirone	<i>Metyraponum</i>	kapsułki miękkie	Leczenie pacjentów z hiperkortyzolemią	E24.0, E24.3, E24.8, E24.9	leczenie endogennego zespołu Cushinga
54.	Myalepta	<i>Metreleptinum</i>	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Lipodystrofia	E88.1	brak
55.	Mylotarg	<i>Gemtuzumab ozogamycinum</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	Ostra białaczka szpikowa	C92.0	W populacji pacjentów pediatrycznych >15 r.ż. ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż)
56.	Naglazyme	<i>Galsulfase</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux-Lamy)	E76.2	brak
57.	Nerlynx	<i>Neratinib</i>	tabletki powlekane	Rak piersi	C50	leczenie adjuwantowe
58.	Nexviadyme	<i>Avalglucosidasum alfa</i>	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Choroba Pompego	E74.0	

59.	Ocaliva	<i>Acidum obeticholicum</i>	tabletki powlekane	Pierwotne żółciowe zapalenie dróg żółciowych	K74.3	leczenie pacjentów dorosłych, u których odpowiedź na leczenie kwasem ursodeoksycholowym (UDCA) jest niedostateczna lub w monoterapii u dorosłych z nietolerancją UDCA w ramach III linii leczenia (po UDCA i innym leczeniu brany pod uwagę w wytycznych klinicznych)
60.	Onivyde pegylated liposomal	<i>Irinotecani hydrochloridum trihydricum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak trzustki w stadium uogólnienia	C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9	brak
61.	Opdivo	<i>Nivolumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak urotelialny	C65, C66, C67	miejscowo zaawansowany lub przerzutowy, nieoperacyjny rak urotelialny w populacji pacjentów dorosłych, po niepowodzeniu wcześniejszej terapii opartej na pochodnych platyny
62.	Opdualag	<i>Nivolumab + relatlimab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Czerniak skóry lub błon śluzowych	C43	I linia leczenia zaawansowanego (nieoperacyjnego lub przerzutowego) czerniaka u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej z ekspresją PD-L1 na komórkach guza <1%
63.	Ozurdex	<i>Dexamethasonum</i>	implant do ciała szklanego w aplikatorze	Zapalenie błony naczyniowej oka - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa	H20.0, H30.0	brak
64.	Phesgo	<i>Pertuzumab + trastuzumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Rak piersi	C50	leczenie neoadjuwantowe pertuzumabem w skojarzeniu z trastuzumabem (podawanych niezależnie lub w formie produktu leczniczego złożonego, zawierającego pertuzumab i trastuzumab do podawania podskórnego) i chemioterapią
65.	Phesgo	<i>Pertuzumab + trastuzumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Rak piersi	C50	leczenie przerzutowego raka piersi pertuzumabem w skojarzeniu z trastuzumabem (podawanych niezależnie lub w formie produktu leczniczego złożonego, zawierającego pertuzumab i trastuzumab do podawania podskórnego) i docetakselem (I linia leczenia przerzutowego raka piersi)



66.	Polivy	<i>Polatuzumabum vedotinum</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe	C82, C83, C85	terapia skojarzona z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem dorosłych chorych z uprzednio nieleczonym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B w ramach I linii leczenia, z IPI 3-5
67.	Raxone	<i>Idebenone</i>	tabletki powlekane	Leczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON)	H47.2	brak
68.	Respreeza	<i>Ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	Leczenie chorych z ciężkim niedoborem alfa-1-antytrypsyny i rozedną płuc	J44.8, E88.0	
69.	Rinvoq	<i>Upadacitinib</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Atopowe zapalenie skóry	L20	w ramach leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry
70.	Rybrevant	<i>Amivantamab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	z aktywującymi mutacjami insercyjnymi w eksonie 20 w genie kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), po niepowodzeniu terapii opartej na pochodnych platyny; w populacji pacjentów dorosłych; leczenie w monoterapii
71.	Saphnelo	<i>Anifrolumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Toczeń rumieniowaty układowy	M32	leczenie uzupełniające u dorosłych pacjentów z aktywnym, seropozytywnym toczeniem rumieniowatym układowym o postaci umiarkowanej do ciężkiej pomimo zastosowania standardowego leczenia
72.	Sarclisa	<i>Isatuximab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	terapia skojarzona z karfilzomibem i deksametazonem u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej 1-3 linie leczenia, z czynnością niewydolnością nerek w momencie rozpoczęcia terapii (eGFR <60 ml/min/1,73m <sup>2</sup> ) oraz w stanie sprawności wg ECOG 0-2)
73	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego	L40	w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne

74.	Strensiq	<i>Asfotsum alfa</i>	roztwór do wstrzykiwań	Hiperfosfatacja dziecięca	E83.3	leczenie pacjentów z objawami kostnymi w przebiegu hipofosfatacji dziecięcej; postacię perinatalną, niemowlęcą i dziecięcą
75.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
76.	Tecentriq	<i>Atezolizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak piersi	C50	potrójnie ujemny rak piersi; terapia skojarzona z nab-paklitaksemem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsiałym procesem chorobowym, z ekspresją PD-L1 $\geq 1\%$ , którzy nie otrzymali terapii z powodu choroby rozsianej
77.	Trepulmix	<i>Treplostinil</i>	roztwór do infuzji	Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne	I27, I27.0, I26	leczenie pacjentów z IV klasą czynnościową wg NYHA/WHO oraz terapia w kolejnej linii leczenia po niepowodzeniu lub nietolerancji monoterapii riociguatem (RIOG) u pacjentów z II/III klasą czynnościową wg NYHA/WHO.
78.	Tysabri	<i>Natalizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Stwardnienie rozsiane	G35	leczenie z zastosowaniem postaci leku podawanej podskórnie, w populacji pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią choroby po niepowodzeniu terapii I rzutu oraz w populacji pacjentów z szybko rozwijającą się ciężką postacią choroby u pacjentów >12 r.ż.
79.	Tysabri	<i>Natalizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Stwardnienie rozsiane	G35	II linia leczenia postaci rzutowo-remisyjnej lub ciężkiej, szybko rozwijającej się rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego, w populacji pacjentów z nietolerancją leczenia natalizumabem w postaci dożylnych lub z powodu zapalenia żył po wlewach dożylnych lub trudnego dostępu do żył
80.	Verquvo	<i>Vericiguat</i>	tabletki powlekane	Przewlekła niewydolność serca	I50	w populacji pacjentów dorosłych
81.	Verzenio	<i>Abemaciclib</i>	tabletki powlekane	Rak piersi	C50	w skojarzeniu z hormonoterapią w ramach leczenia uzupełniającego dorosłych pacjentów we wczesnym stadium raka piersi wykazującego ekspresję receptora hormonalnego (HR) i niewykazującego ekspresji receptora HER2 z przerzutami do węzłów chłonnych, z wysokim ryzykiem wystąpienia nawrotu

82.	Voxzogo	<i>Vosoritidum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Achondroplazja	Q77.4	leczenie pacjentów z achondroplazją u pacjentów w wieku co najmniej 2 lat, u których nasady kości długich nie są zamknięte
83.	Vyndaqel	<i>Tafamidisum</i>	kapsułki miękkie	kardiomiopatia w przebiegu amyloidozy transtyretynowej	E85	brak
84.	Vyndaqel	<i>Tafamidisum</i>	kapsułki miękkie	rodzinna transtyretynowa polineuropatia amyloidowa (TTR-FAP)	E85.1	
85.	Vyvgart	<i>Efgartigimod alfa</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Miastenia	G70.0	uogólniona postać choroby u pacjentów, u których stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko receptorowi acetylocholinyl
86.	Xgeva	<i>Denosumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Guz olbrzymiokomórkowy kości	D48.0	brak
87.	Xospata	<i>Gilteritinibi fumaras</i>	tabletki powlekane	Leczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowej gilteritynibem	C92.0	leczenie podtrzymujące remisję
88.	Xtandi	<i>Enzalutamidum</i>	kapsułki miękkie	Rak gruczołu krokowego	C61	terapia hormonowrażliwego przerzutowego raka gruczołu krokowego; leczenie skojarzone z terapią deprywacji androgenowej
89.	Xtandi	<i>Enzalutamidum</i>	tabletki powlekane	Rak gruczołu krokowego	C61	terapia hormonowrażliwego przerzutowego raka gruczołu krokowego; leczenie skojarzone z terapią deprywacji androgenowej
90.	Xtandi	<i>Enzalutamidum</i>	kapsułki miękkie	Rak gruczołu krokowego	C61	leczenie choroby <b>opornej na kastrację</b> u chorych po wcześniejszym leczeniu octanem abirateronu oraz docetakselem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa
91.	Xtandi	<i>Enzalutamidum</i>	tabletki powlekane	Rak gruczołu krokowego	C61	leczenie choroby <b>opornej na kastrację</b> u chorych po wcześniejszym leczeniu octanem abirateronu oraz docetakselem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa
92.	Yervoy	<i>Ipilimumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Czerniak skóry lub błon śluzowych	C43	dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii

93.	Yervoy	<i>Ipilimumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak przełyku	C15	I linia leczenia u pacjentów dorosłych z zaawansowanym, nieoperacyjnym, nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku oraz ekspresją PD-L1 na komórkach guza wynoszącą $\geq 1\%$ , <b>terapia skojarzona z niwolumabem</b>
94.	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	Leczenie chorych na raka jajnika, jajowodu lub raka otrzewnej	C56, C57, C48	leczenie podtrzymujące chorych na nawrotowego platynowrażliwego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
95.	Zolgensma	<i>Onasemnogene abeparvovec</i>	roztwór do infuzji	Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (ICD-10: G12)	G12	w zakresie pacjentów nieobjętych programem lekowym