

Instrukcja przygotowania się do kolonoskopii z wykorzystaniem preparatu CitraFleet®

Zalecenia lekarskie

Nazwisko i imię pacjenta

1. dawka CitraFleet® (data i godzina)	2. dawka CitraFleet® (data i godzina)	Kolonoskopia (data i godzina)

**Odstęp między pierwszą
a drugą dawką 6–8 h**

WAŻNE! W trakcie stosowania produktu CitraFleet®, w celu skutecznego działania leku, oczyszczenia jelita oraz zapewnienia właściwego nawodnienia organizmu, **należy przyjmować około 250 ml (szklanka) wody lub innego klarownego płynu na godzinę (około 2 litry po każdej dawce)** do momentu ustąpienia działania przeczyszczającego. Po tym czasie należy przyjmować klarowne płyny lub wodę, aby zaspokoić pragnienie bądź zastosować się do zaleceń lekarza.

**Dozwolone płyny,
na przykład woda, herbata**



Jeżeli kolonoskopia będzie wykonana w znieczuleniu ogólnym, należy zastosować się do szczegółowych zaleceń lekarza.
Po przyjęciu pierwszej dawki CitraFleet® nie należy przyjmować już żadnych posiłków.

Zalecenia lekarza

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja przygotowania się do kolonoskopii z wykorzystaniem preparatu



1

1. dawka, godzina zgodnie z zaleceniem lekarza



Miejsce na wpisanie godziny przyjęcia dawki 1.

Krok 1. – Wsyp zawartość 1 saszetki do filiżanki zimnej wody (około 150 ml).
Krok 2. – Mieszaj przez 2–3 minuty. Jeżeli zawartość rozgrzeje się podczas mieszania, odczekaj przed wypiciem całego roztworu do momentu ochłodzenia. Mętną zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu.

Okolo
2 litrów
płynów



2

2. dawka, 6–8 godzin po pierwszej dawce



Miejsce na wpisanie godziny przyjęcia dawki 2.

Przygotuj 2. dawkę
(zgodnie z zaleceniami opisanymi powyżej w krokach 1. i 2.).

Okolo
2 litrów
płynów



Kolonoskopia

**Niezastosowanie się do zaleceń
może spowodować konieczność powtórzenia badania
z powodu niewłaściwego oczyszczenia jelita.**